



DIARIO
della
CEFALEA



#6 GIUGNO

ANNO _____

GIORNO	DALLE - ALLE	INTENSITA' 0-10	DOVE	TIPO DOLORE	ALTRI SINTOMI	* SINTOMI PRE-ATTACCO	FATTORI SCATENANTI	FARMACO QUANTITA'	TRATTAM. ALTERNATIVO	** EFFICACIA FARMACO E TRATTAM.
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										

***Sintomi che possono precedere un attacco di cefalea**

Sbadigliare; desiderio ardente di cibo; sentire freddo; sudorazione; disturbi del sonno; frequente necessità di urinare; sete; cambiamenti d'umore (irritabilità – depressione – sentirsi stressato); stanchezza/affaticamento; agitazione/irrequietezza/euforia; difficoltà a concentrarsi, leggere o parlare; problemi di memoria; dolore o rigidità al collo; eccessiva sensibilità alla luce; eccessiva sensibilità ai rumori; eccessiva sensibilità agli odori; nausea; vertigine.

**** Efficacia del trattamento (farmacologico o alternativo)**

Molto peggiorato un po' peggio nessun cambiamento un po' meglio molto meglio completamente passato
 _____ -2 _____ -1 _____ 0 _____ +1 _____ +2 _____ +3 _____

7 LUGLIO

ANNO _____

GIORNO	DALLE - ALLE	INTENSITA' 0-10	DOVE	TIPO DOLORE	ALTRI SINTOMI	* SINTOMI PRE-ATTACCO	FATTORI SCATENANTI	FARMACO QUANTITA'	TRATTAM. ALTERNATIVO	** EFFICACIA FARMACO E TRATTAM.
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										

***Sintomi che possono precedere un attacco di cefalea**

Sbadigliare; desiderio ardente di cibo; sentire freddo; sudorazione; disturbi del sonno; frequente necessità di urinare; sete; cambiamenti d'umore (irritabilità – depressione – sentirsi stressato); stanchezza/affaticamento; agitazione/irrequietezza/euforia; difficoltà a concentrarsi, leggere o parlare; problemi di memoria; dolore o rigidità al collo; eccessiva sensibilità alla luce; eccessiva sensibilità ai rumori; eccessiva sensibilità agli odori; nausea; vertigine.

**** Efficacia del trattamento (farmacologico o alternativo)**

Molto peggiorato un po' peggio nessun cambiamento un po' meglio molto meglio completamente passato
 _____ -2 _____ -1 _____ 0 _____ +1 _____ +2 _____ +3 _____

8 AGOSTO

ANNO _____

GIORNO	DALLE - ALLE	INTENSITA' 0-10	DOVE	TIPO DOLORE	ALTRI SINTOMI	* SINTOMI PRE-ATTACCO	FATTORI SCATENANTI	FARMACO QUANTITA'	TRATTAM. ALTERNATIVO	** EFFICACIA FARMACO E TRATTAM.
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										

***Sintomi che possono precedere un attacco di cefalea**

Sbadigliare; desiderio ardente di cibo; sentire freddo; sudorazione; disturbi del sonno; frequente necessità di urinare; sete; cambiamenti d'umore (irritabilità – depressione – sentirsi stressato); stanchezza/affaticamento; agitazione/irrequietezza/euforia; difficoltà a concentrarsi, leggere o parlare; problemi di memoria; dolore o rigidità al collo; eccessiva sensibilità alla luce; eccessiva sensibilità ai rumori; eccessiva sensibilità agli odori; nausea; vertigine.

**** Efficacia del trattamento (farmacologico o alternativo)**

Molto peggiorato un po' peggio nessun cambiamento un po' meglio molto meglio completamente passato
 -2 -1 0 +1 +2 +3

#9 SETTEMBRE

ANNO _____

GIORNO	DALLE - ALLE	INTENSITA' 0-10	DOVE	TIPO DOLORE	ALTRI SINTOMI	* SINTOMI PRE-ATTACCO	FATTORI SCATENANTI	FARMACO QUANTITA'	TRATTAM. ALTERNATIVO	** EFFICACIA FARMACO E TRATTAM.
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										

***Sintomi che possono precedere un attacco di cefalea**

Sbadigliare; desiderio ardente di cibo; sentire freddo; sudorazione; disturbi del sonno; frequente necessità di urinare; sete; cambiamenti d'umore (irritabilità – depressione – sentirsi stressato); stanchezza/affaticamento; agitazione/irrequietezza/euforia; difficoltà a concentrarsi, leggere o parlare; problemi di memoria; dolore o rigidità al collo; eccessiva sensibilità alla luce; eccessiva sensibilità ai rumori; eccessiva sensibilità agli odori; nausea; vertigine.

**** Efficacia del trattamento (farmacologico o alternativo)**

Molto peggiorato un po' peggio nessun cambiamento un po' meglio molto meglio completamente passato
 _____ -2 _____ -1 _____ 0 _____ +1 _____ +2 _____ +3 _____

#11 NOVEMBRE

ANNO _____

GIORNO	DALLE - ALLE	INTENSITA' 0-10	DOVE	TIPO DOLORE	ALTRI SINTOMI	* SINTOMI PRE-ATTACCO	FATTORI SCATENANTI	FARMACO QUANTITA'	TRATTAM. ALTERNATIVO	** EFFICACIA FARMACO E TRATTAM.
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										

***Sintomi che possono precedere un attacco di cefalea**

Sbadigliare; desiderio ardente di cibo; sentire freddo; sudorazione; disturbi del sonno; frequente necessità di urinare; sete; cambiamenti d'umore (irritabilità – depressione – sentirsi stressato); stanchezza/affaticamento; agitazione/irrequietezza/euforia; difficoltà a concentrarsi, leggere o parlare; problemi di memoria; dolore o rigidità al collo; eccessiva sensibilità alla luce; eccessiva sensibilità ai rumori; eccessiva sensibilità agli odori; nausea; vertigine.

**** Efficacia del trattamento (farmacologico o alternativo)**

Molto peggiorato un po' peggio nessun cambiamento un po' meglio molto meglio completamente passato
 _____ -2 _____ -1 _____ 0 _____ +1 _____ +2 _____ +3 _____

ReSet Studio – Fisioterapia & Salute
Via Castellana, 86 - 31100 Treviso
347 3233029
www.resetstudio-treviso.com
 ReSet Studio

